簡易懸濁対応表

123P<>○/

抗腫瘍	医薬品名	簡易懸濁可否
☐	アーガメイト20%ゼリー25g	□(注入器具がシリンジの場合ゼリーを直接入れ
☐	アサコール錠400mg	×
☐	アスパラカリウム錠300mg	□●(懸濁直前に破壊)
☐	アスピリン「メタル」	□
☐	アゼルニジピン錠16mg「NP」	●
☐	アタラックスーP散10%	⇔
☑	アナストロゾール錠1mg「NK」	□○(暴露注意)
☐	25mgアリナミンF糖衣錠	●
☑	アリミデックス錠1mg	□○(暴露注意)
☐	アレビアチン散10%	⇔
☐	アローゼン顆粒(0．5)	□(14Fr)
☐	イーケプラ錠500mg	●
☐	イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	●
☐	インクレミンシロップ5%	⇔
☐	ウリンメット配合錠	●
☐	つくしA・M配合散	□○(炭酸水素Na含有)
☐	エカベトNa顆粒66．7%「サワイ」	□(嚥下補助ゼリー)
☐	エサンブトール錠250mg	×
☐	エパルレスタット錠50mg「ファイザー」	●
☐	エブランチルカプセル15mg	×
☐	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	●
☐	MSコンチン錠10mg	×
☐	エリスロシン錠100mg	□●(腸)
☐	塩化ナトリウム	□○(単独)
☐	オキシコンチン錠5mg	×
☐	オキシコンチン錠20mg	×
☐	オースギ大黄甘草湯エキスT錠(2錠包)	×
☐	オゼックス細粒小児用15%	□○(Mg・Ca等注意)
☐	ガスコンドロップ内用液2%	⇔
☐	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	□●(腸)
☐	カリメート散(5)	□(5g+水30～50mlで懸濁し、すぐに注入)
☐	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	●
☐	クリアナール錠200mg	●
☐	グリチロン配合錠	●
☐	クレメジン細粒分包2g	□(嚥下補助ゼリー可)
☐	クロルフェネシンカルバミン酸ｴｽﾃﾙ錠250mg「ｻﾜｲ」	●
☐	コロネル細粒83．3%(1．2)	×
☐	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」	●
☐	ジェニナック錠200mg	□○(Mg・Ca等注意)

☐	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	●
☐	シナール配合顆粒	□○（単独）
☐	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	×
☐	シングレア錠10mg	●
☐	シングレア細粒4mg	⇔
☐	スローケー錠600mg	×
☐	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	●
☐	セフジニル錠100mg「サワイ」	□○（Mg・Ca等注意）
☐	セルシン散1％	⇔
☐	セルニルトン錠	×
☐	セレコックス錠100mg	●
☐	セレニカR顆粒40％	×
☐	セロクラール錠10mg	●
☐	センノシド錠12mg「サワイ」	●
☐	ゾーミッグ錠2．5mg	？
☐	ソランタール錠100mg	●
☐	炭酸水素ナトリウム	□○（単独）
☐	チアプリド錠25mg「サワイ」	●
☐	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	●
☐	チラーヂンS錠50μg	□○（Mg・Ca等注意）
☑	ティーエスワン配合OD錠T20	○（脱カプセル不可）
☑	ティーエスワン配合OD錠T25	○（脱カプセル不可）
☐	テオドールドライシロップ20％	□○（水で懸濁）
☐	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	×⇔
☐	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	×⇔
☐	デパケンR錠100mg	×
☐	デパケンR錠200mg	×
☐	テプレノンカプセル50mg「サワイ」	□○（フラッシュ多目）
☐	ドパストン散98．5％	□○（単独）
☐	トフラニール錠10mg	×
☐	トラゼンタ錠5mg	●
☐	トラベルミン配合錠	●
☐	トラムセット配合錠	●
☐	トランサミン散50％	⇔
☐	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」	●
☐	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	●
☐	ニトロールRカプセル20mg	×
☐	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	×
☐	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	×
☐	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	×
☐	ネオドパストン配合錠L100	□○（Mg・Ca等注意　単独）

☐	ノイロトロピン錠4単位	×
☐	ノルペースカプセル100mg	□○（フラッシュ多目）
☐	ノルペースCR錠150mg	×
☐	バイアスピリン錠100mg	⇔
☐	バラシクロビル錠500mg「三和」	●
☐	バルトレックス錠500mg	●
☐	バルトレックス顆粒50％	⇔
☐	パンスポリンT錠100mg	×
☐	ビオフェルミンR錠6mg	●
☐	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」	●
☐	ピドキサール錠10mg	●
☐	ファモチジン散10％「日医工」	⇔
☐	ブシラミン錠100mg「日医工」	●
☐	プラザキサカプセル110mg	×
☐	フラジール内服錠250mg	□●
☐	プラビックス錠75mg	●
☐	プロヘパール配合錠	×
☐	ベゲタミンーB配合錠	□●
☐	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	×
☐	ベシケア錠5mg	□●（暴露注意）
☐	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	●
☐	ペリアクチン散1％	⇔
☐	ベリチーム配合顆粒	×
☐	ポリカルボフィルCa細粒83．3％「日医工」	×
☐	マドパー配合錠	□○（Mg・Ca等注意　単独）
☐	ミカルディス錠40mg	●
☐	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2％「サワイ」	□●（Mg・Ca等注意）
☐	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」	□●（Mg・Ca等注意）
☐	メサラジン錠250mg「ケミファ」	×
☐	メチコバール錠500μg	□○（要遮光）
☐	メトグルコ錠250mg	●
☐	メナテトレノンカプセル15mg「F」	×
☐	メルカゾール錠5mg	□●
☐	薬用炭	×
☑	ユーゼル錠25mg	□○（暴露注意）
☐	ユニフィルLA錠200mg	×
☐	ラシックス細粒4％	⇔
☐	リウマトレックスカプセル2mg	□○（脱カプ不可）
☐	リーバクト配合顆粒（4．15）	□（嚥下補助ゼリー可）
☐	リマチル錠100mg	×
☐	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	●

□	リンデロンシロップ0．01％	⇔
□	レグパラ錠25mg	×
□	レスタミンコーワ錠10mg	●
□	レナジェル錠250mg	×
□	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	□○（Mg・Ca等注意）
□	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	●
□	ロコルナール錠100mg	●
□	ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」	●
□	ロラタジン錠10mg「サワイ」	●
□	ワークミンカプセル0．25μg	×
□	ワークミンカプセル0．5μg	×
□	ワソラン錠40mg	●